

**Gebrauchsinformation:**  
**Information für Patienten**

# Rheumagil®

**Homöopathische Tabletten**  
**Homöopathisches Arzneimittel bei**  
**Erkrankungen des Bewegungsapparates**

Wirkstoffe: Causticum Hahnemanni Trit. D6,  
Ferrum phosphoricum Trit. D6,  
Ledum Trit. D2, Rhododendron Trit. D2

**Tabletten zum Einnehmen**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

**Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Rheumagil homöopathische Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Rheumagil homöopathische Tabletten beachten?
3. Wie ist Rheumagil homöopathische Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Rheumagil homöopathische Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Rheumagil homöopathische Tabletten und wofür wird es angewendet?**

Dieses Arzneimittel ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Rheumatismus.

**Hinweis:** Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Rheumagil homöopathische Tabletten beachten?**

**Rheumagil homöopathische Tabletten darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- von Schwangeren
- von Stillenden
- von Säuglingen
- von Kindern und Heranwachsenden bis 18 Jahren

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Rheumagil homöopathische Tabletten einnehmen.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Rheumagil homöopathische Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Einnahme von Rheumagil homöopathische Tabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln:**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

**Einnahme von Rheumagil homöopathische Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Rheumagil homöopathische Tabletten darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:**

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für Rheumagil homöopathische Tabletten empfohlenen Dosen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 3. Wie ist Rheumagil homöopathische Tabletten einzunehmen?

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene:	
<b>Akute Zustände</b>	
Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich	<b>je 1 Tablette</b> (max. 6 Tabletten täglich)
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.	
<b>Chronische Verlaufsformen</b>	
1 bis 3 mal täglich	<b>je 1 Tablette</b> (max. 3 Tabletten täglich)
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.	

#### Art der Anwendung:

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten Sie die Tabletten im Mund zergehen lassen.

#### Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Rheumagil homöopathische Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten:

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### Wenn Sie die Einnahme von Rheumagil homöopathische Tabletten vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### Wenn Sie die Einnahme von Rheumagil homöopathische Tabletten abbrechen:

Sie können die Einnahme zu jeder Zeit unterbrechen oder beenden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Zu Rheumagil homöopathische Tabletten sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt.

**Hinweis:** Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist Rheumagil homöopathische Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf den Blisterstreifen und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### Was Rheumagil homöopathische Tabletten enthält:

1 Tablette zu 320 mg enthält:

- Causticum Hahnemanni Trit. D6 50,0 mg  
(ab D2 als Verreibung potenziert)
- Ferrum phosphoricum Trit. D6 50,0 mg
- Ledum Trit. D2 50,0 mg
- Rhododendron Trit. D2 3,2 mg

#### Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Maisstärke, vorverkleisterte Stärke, Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

#### Wie Rheumagil homöopathische Tabletten aussieht und Inhalt der Packung:

**Aussehen:** Weiße, runde Tabletten.

**Packung:** Originalpackungen mit 25 Tabletten, 50 Tabletten, 100 Tabletten und 150 Tabletten.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Heilpflanzenwohl GmbH  
Alt-Moabit 101D  
10559 Berlin  
Tel.: +49 30 209 66 97 81  
Fax: +49 30 209 66 97 89  
Email: [hpw@heilpflanzenwohl.com](mailto:hpw@heilpflanzenwohl.com)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2022.